



Crapaud commun (*Bufo spinosus*)

Où et quand l'observer ?

Surtout dans les zones peu profondes des étangs où il se reproduit en février/mars, le reste du temps sous divers abris : pierres, souches, feuilles ...

Comment le reconnaître ?

- Pupille horizontale
- Œil rouge cuivré à orange
- Corps à pustules

Un atout pour votre jardin

Consomme des limaces et insectes ravageurs du jardin.



Salamandre tachetée (*Salamandra salamandra*)

Où et quand l'observer ?

Au printemps et à l'automne en migration sur les routes, principalement dans les bois de feuillus.

Insolite : la Salamandre pond dans les mares où elle a pied car elle ne sait pas nager.

Comment le reconnaître ?

Ressemble à un petit lézard noir et jaune.

Comment l'accueillir ?

Une petite mare sans poisson fera son bonheur.



Quelques espèces pour aller plus loin



Crapaud calamite
(*Bufo calamita*)



Grenouille agile
(*Rana dalmatina*)



Triton crêté
(*Triturus cristatus*)

Photo : Alexandre BARD



Triton marbré
(*Triturus marmoratus*)

Photo : Annie Sallé

Méfiez-vous des certitudes.

*En cas de doute, n'hésitez pas à prendre des photos
ou à nous demander conseil.*

Et pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou à vous procurer des guides de détermination.

Contactez-nous :
observations@sologne-nature.org





Paon du jour (*Inachis io*)

Où et quand l'observer ?

De juin à octobre dans les jardins

Insolite : La chenille du Paon-du-jour raffole des orties.

Comment le reconnaître ?

Dessus rouge vineux avec ocelles bleus de chaque côté.

Comment l'accueillir ?

Conserver un carré d'orties au fond de son jardin pour les chenilles.

Des fleurs sauvages pour les adultes.



Libellule à quatre tâches (*Libellula quadrimaculata*)

Où et quand l'observer ?

De mai à mi-septembre sur la végétation des eaux stagnantes.

Insolite : les mâles se perchent sur la végétation pour surveiller leur territoire.

Comment la reconnaître ?

- Ailes ouvertes au repos
- Quatre tâches noires par paire d'ailes

Comment l'accueillir ?

Mares sans poisson et avec beaucoup de plantes aquatiques.



Quelques espèces pour aller plus loin



Citron
(*Gonepteryx rhamni*)



Flambé porte-queue
(*Iphiclides podalirius*)



Libellule déprimée
(*Libellula depressa*)



Aurore
(*Anthocharis cardamines*)

Photo : Weinsberg



Machaon
(*Papilio machaon*)



Anax empereur
(*Anax imperator*)

Photo : Rosine


Méfiez-vous des certitudes.

En cas de doute, n'hésitez pas à prendre des photos ou à nous demander conseil.

Et pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou à vous procurer des guides de détermination.



Contactez-nous :
observations@sologne-nature.org





Orvet fragile (*Anguis fragilis*)

Où et quand l'observer ?

Toute l'année dans les jardins, caché sous des feuilles, haies, compost, ...

Insolite : malgré les apparences l'orvet n'est pas un serpent mais un lézard.

Comment le reconnaître ?

- Corps marron clair à marron brique (voire gris pour juvéniles)
- Longueur : 15 à 30 cm
- Ressemble à un petit serpent

Un atout pour votre jardin

Consomme des limaces et insectes ravageurs du jardin.



Lézard des murailles (*Podarcis muralis*)

Où et quand l'observer ?

Rencontré fréquemment sur les murs des jardins ensoleillés.

Insolite : le lézard des murailles pond des œufs, on dit qu'il est ovipare.

Comment le reconnaître ?

- Corps environ 20 cm (tête à la queue)
- Coloration variable (marron à gris avec des tâches blanches)

Comment l'accueillir ?

Des zones d'ensoleillement (murs, souches...) pour qu'il puisse se réchauffer.



Quelques espèces pour aller plus loin



Lézard vert occidental
(*Lacerta bilineata*)



Couleuvre à collier
(*Natrix natrix*)



Vipère aspic
(*Vipera aspis*)

Photo : Laurent Lebouais



Cistude d'Europe
(*Emys orbicularis*)

Photo : Alexandr Almond

Méfiez-vous des certitudes.

En cas de doute, n'hésitez pas à prendre des photos ou à nous demander conseil.

Et pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou à vous procurer des guides de détermination.



Contactez-nous :
observations@sologne-nature.org



Photo : Jean François Gaffard



Primevère officinale (*Primula veris*)

Où et quand l'observer ?

D'avril à mai dans les prés, broussailles, bois clair, talus...

Insolite : les racines ont des propriétés médicinales (analgésiques, anti-spasmodiques, diurétiques et expectorantes)

Comment le reconnaître ?

Plante poilue. Fleurs jaune foncé avec des marques orange au cœur, penchées d'un côté.

Comment l'accueillir ?

Laisser des zones non fauchées au printemps.



Lobélie brûlante (*Lobelia urens*)

Où et quand l'observer ?

De juillet à octobre dans les prés en lisière de forêts, dans les terrains un peu humides.

Insolite : la Lobélie était autrefois utilisée comme sédatif ou expectorant.

Comment la reconnaître ?

Fleurs bleu pâle ou pourprées en grappes le long de la tige.

Comment l'accueillir ?

Conserver des zones non tondues au printemps et en été.



Quelques espèces pour aller plus loin



Stellaire holostée
(*Stellaria holostea*)



Compagnon blanc
(*Silene alba*)



Campanule raiponce
(*Campanula rapunculus*)

Photo : Jean-François Garreau



Potentille tormentille
(*Potentilla erecta*)



Vipérine commune
(*Echium vulgare*)

Méfiez-vous des certitudes.

En cas de doute, n'hésitez pas à prendre des photos ou à nous demander conseil.

Et pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou à vous procurer des guides de détermination.

Contactez-nous :
observations@sologne-nature.org





Hérisson d'Europe (*Erinaceus europaeus*)

Où et quand l'observer ?

Du printemps à l'automne dans les haies, jardins et broussailles. On l'observe plutôt en soirée et la nuit.

Insolite : le hérisson possède environ 6000 piquants.

Un atout pour votre jardin

Consomme des limaces et insectes ravageurs du jardin.

Comment l'accueillir ?

Laisser un tas de bois ou de feuilles mortes au fond du jardin. Laisser des coins sauvages pour la biodiversité (sa source de nourriture) dans votre jardin.



Écureuil roux (*Sciurus vulgaris*)

Où et quand l'observer ?

Toute l'année dans les bois, parcs et jardins boisés.

Insolite : L'écureuil roux sait nager.

Comment le reconnaître ?

Pelage brun roux à brun foncé dessus et blanc dessous.

Comment l'accueillir ?

Conserver des arbres à cavités et des arbustes à fruits (noisetiers, néfliers etc.).



Quelques espèces pour aller plus loin



Fouine
(*Martes foina*)



Martre des pins
(*Martes martes*)

Photo : Dani Kropp



Lérot
(*Eliomys quercinus*)

Photo : Christian UCEP



Renard roux
(*Vulpes vulpes*)

Méfiez-vous des certitudes.

En cas de doute, n'hésitez pas à prendre des photos ou à nous demander conseil.

Et pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou à vous procurer des guides de détermination.

Contactez-nous :
observations@sologne-nature.org





Pic Vert (*Picus viridis*)

Comment le reconnaître ?

Plumage essentiellement vert avec un croupion jaune, et le dessus de la tête rouge.

Où et quand l'observer ?

Toute l'année dans les parcs, jardins, vergers, bosquets et bois clairs.

Insolite : Se nourrit principalement de fourmis à terre dans les pelouses.

Comment l'accueillir ?

Éviter les pesticides qui détruisent sa source de nourriture, les insectes.



Photo : Frédéric Petsy

Rougequeue à front blanc (*Erinaceus europaeus*)

Comment le reconnaître ?

Mâle dos gris ardoise, poitrine rouge orangé et queue rousse. Masque noir rehaussé d'un bandeau blanc sur le front.

Comment l'accueillir ?

Installer un nichoir semi-ouvert (ouverture 32 mm x 46 mm) qu'il adopte facilement. Limiter l'utilisation d'insecticides : ils tuent sa nourriture.

Où et quand l'observer ?

D'avril à août dans les jardins avec présence d'arbres feuillus.



Quelques espèces pour aller plus loin



Chouette effraie
(*Tyto alba*)



Chardonneret élégant
(*Carduelis carduelis*)

Photo : Emmanuel Fretz



Mésange charbonnière
(*Parus major*)



Rougequeue noir
(*Phoenicurus ochruros*)

Photo : Emmanuel Fretz



Rougegorge familier
(*Erithacus rubecula*)

Photo : Emmanuel Fretz



Mésange bleue
(*Parus caeruleus*)

Photo : Emmanuel Fretz

Méfiez-vous des certitudes.

En cas de doute, n'hésitez pas à prendre des photos ou à nous demander conseil.

Et pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou à vous procurer des guides de détermination.

Contactez-nous :
observations@sologne-nature.org

