



**Pic Vert** (*Picus viridis*)

## Comment le reconnaître ?

Plumage essentiellement vert avec un croupion jaune, et le dessus de la tête rouge.

## Où et quand l'observer ?

Toute l'année dans les parcs, jardins, vergers, bosquets et bois clairs.

**Insolite :** Se nourrit principalement de fourmis à terre dans les pelouses.

## Comment l'accueillir ?

Éviter les pesticides qui détruisent sa source de nourriture, les insectes.




Photo : Frédéric Petsy

**Rougequeue à front blanc** (*Erinaceus europaeus*)

## Comment le reconnaître ?

Mâle dos gris ardoise, poitrine rouge orangé et queue rousse. Masque noir rehaussé d'un bandeau blanc sur le front.

## Comment l'accueillir ?

Installer un nichoir semi-ouvert (ouverture 32 mm x 46 mm) qu'il adopte facilement. Limiter l'utilisation d'insecticides : ils tuent sa nourriture.

## Où et quand l'observer ?

D'avril à août dans les jardins avec présence d'arbres feuillus.



# Quelques espèces pour aller plus loin



**Chouette effraie**  
(*Tyto alba*)



**Chardonneret élégant**  
(*Carduelis carduelis*)

Photo : Emmanuel Fretz



**Mésange charbonnière**  
(*Parus major*)



**Rougequeue noir**  
(*Phoenicurus ochruros*)

Photo : Emmanuel Fretz



**Rougegorge familier**  
(*Erithacus rubecula*)

Photo : Emmanuel Fretz



**Mésange bleue**  
(*Parus caeruleus*)

Photo : Emmanuel Fretz

*Méfiez-vous des certitudes.*

*En cas de doute, n'hésitez pas à prendre des photos ou à nous demander conseil.*

Et pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou à vous procurer des guides de détermination.

Contactez-nous :  
[observations@sologne-nature.org](mailto:observations@sologne-nature.org)

